var. **brevisepala** (Brenan) Hara, comb. nov.

Juss. suffruticosa var. *brevisepala* Brenan in Kew Bull. 1953, 168 (1953).

var. **piloso-linearis** (Brenan) Hara, comb. nov.

Juss. suffruticosa var. *piloso-linearis* Brenan, l. c. 169 (1953).

Ludwigia quadrangularis (Micheli) Hara, comb. nov.

Juss. quadrangularis Micheli in Flora **57**: 302 (1874).

Ludwigia sedioides (Humb. et Bonpl.) Hara, comb. nov.

Juss. sedioides Humb. et Bonpl., Pl. Aequin. **1**: 13 (1808).

Ludwigia sericea (Camb.) Hara, comb. nov.

Juss. sericea Camb. in St. Hil. l. c. 260 (1829).

Ludwigia stenorraphe (Brenan) Hara, comb. nov.

Juss. stenorraphe Brenan in Kew Bull. 1953, 164.

Ludwigia tomentosa (Camb.) Hara, comb. nov.

Juss. tomentosa Camb. in St. Hil., l. c. 254 (1829).

Ludwigia torulosa (Arnott) Hara, comb. nov.

Juss. torulosa Arnott in Ann. Sci. Nat. ser. 2, **3**: 251 (1835).

Ludwigia uruguayensis (Camb.) Hara, comb. nov.

Juss. uruguayensis Camb. in St. Hil., l. c. 264 (1829).

既に本誌 **17**: 346 (1941) でふれておいた様に，チョウジタデ属 (*Ludwigia* L.) とミズキンバイ属 (*Jussiaea*) とは雄蕊の数以外にははっきりした区別点がない。反つて他の性質では極めて近縁と思われる種が別属に入る場合もあり不都合なので，ここに正式に両属を合一する。最近アフリカの種を検討した Brenan (1953) も同一結論に達した。両属は共にリンネが同時に記載した名なので，現行国際命名法により，この両属を最初に合一した Baillon (1877) に従つて **Ludwigia** の属名を採用する。我国に関係のある種はチョウジタデ *Ludwigia prostrata* Roxb., ウスゲチョウジタデ *L. Greatrexii* Hara, コバノタゴボウ *L. perennis* L., タゴボウモドキ *L. micrantha* (Kunze) Hara, キダチキンバイ *L. pubescens* (L.) Hara var. *villosa* (Lam.) Hara, ミズユキノシタ *L. ovalis* Miq., ミズキンバイ *L. adscendens* (L.) Hara var. *stipulacea* (Ohwi) Hara である。

□宮部金吾博士記念出版刊行会: **宮部金吾** 365 pp. (1953) 岩波書店 (340 円)

宮部先生の伝記で，先生の留学の前までは自叙伝であり，以後は先生が亡くなられてからの補遺で伊藤誠哉，館脇操両博士に負う所が大きい。